



Blutstillung mit Tourniquet

(AGA San D, Lektion 4)

Lektionenziele

- Auswendig aufzählen, wann das Anlegen des Tourniquets indiziert ist.
- Die Einsatzbereitschaft des Tourniquets gemäss Reglement selbstständig erstellen.
- Das Tourniquet an den Armen und Beinen sich selbst und einem Patienten korrekt anlegen.




Blutstillung mit Tourniquet (AGA San D, Lektion 4)

Anwendung

- **wenn möglich direkt auf der Haut**
- **zwischen Wunde und Herz**
- **Tourniquet darf nicht über Gelenke angelegt werden**

Das Tourniquet ist nur für starke, lebensbedrohliche Blutungen vorgesehen, nicht für Bagatellwunden.






Blutstillung mit Tourniquet (AGA San D, Lektion 4)

Anlegezeit

Die Anlegezeit des Tourniquets muss auf dem Patienten notiert werden.

Wenn ein geeigneter Schreiber (auch Kugelschreiber) vorhanden ist, kann die Anlegezeit auf dem Pat notiert werden (Hand, Arm, Bein oder Stirne).



Alternative Möglichkeit

Da bei jeder Verletzung grundsätzlich ein (Deck-) Verband gemacht wird, kann die Zeit auch auf dem Patientenzettel im IVP 90 notiert werden.

Vorteil: Verwendung von Bleistift, Kugelschreiber, Filz- / Farbschreiber

Pat Zettel an Erkennungsmarke befestigen



Blutstillung mit Tourniquet

(AGA San D, Lektion 4)

Warnhinweise

- **Das Tourniquet ist nur für Personen bestimmt, welche in seiner Anwendung ausgebildet wurden.**
- **Es soll nur gemäss Vorschrift verwendet werden.**
- **Fehlerhafte Anwendung kann zu ernststen Verletzungen oder zum Verlust einer Gliedmasse führen.**
- **Das Tourniquet ist die ERSTE MÖGLICHKEIT zur Blutstillung im Gefecht.**
- **In anderen Fällen sollte es nur angewandt werden, wenn die anderen Methoden, die Blutung zu stoppen, nicht funktionieren, die Extremität amputiert ist oder die Situation lebensbedrohend ist.**



Blutstillung mit Tourniquet (AGA San D, Lektion 4)

C-A-T Combat Application Tourniquet



- 1 Klettriemen**
- 2 Verschluss**
- 3 Winde-Clip**
- 4 Spannhebel**
- 5 Sicherungsband**



Blutstillung mit Tourniquet (AGA San D, Lektion 4)

Verweildauer des angelegten Tourniquet

Abbindungen gehören auch im OP zur täglichen Routine und verursachen bei ein- bis mehrstündiger Anwendung kaum je Schäden.

Achtung!

Patienten mit nicht kontrollierbaren Blutungen müssen innert zwei Stunden chirurgisch behandelt werden.

